

# LE CHEVREUIL - *Capreolus capreolus*



Roe deer  
Corzo


Classe : Mammifères  
Ordre : Artiodactyles  
Famille : Cervidés


Poids : de 20 à 30 kg

Statut : Soumis à un plan  
de chasse obligatoire




Répartition  
géographique

 The roe deer is the smallest cervidae living in a wild state in Europe. Both genders have a light spot on the buttock. Only male has antlers which fall every year in October-November. Roe deer breeding is unique among the cervidae. Coupling takes place in the middle of the summer, but gestation will not start until the month of December. Such delayed gestation allows the fawns to be born at a more favourable time.

 El corzo es el más pequeño de los cérvidos Europeos que viven en libertad. Ambos sexos tienen una mancha clara denominada "escudo" en el trasero. Tan solo el macho tiene cornamenta y pierde las astas cada año entre octubre y noviembre. La reproducción de los corzos es única entre los cérvidos. La brama se produce en verano, pero la gestación no comienza hasta diciembre. La gestación diferida permite que los corzinos nazcan a una época más favorable.

## LES BOIS


Seul le mâle, nommé brocard, porte des bois. Ils tombent chaque année en novembre, pour repousser en mars.



Andouillers

Perlures

## LE PELAGE



Miroir en forme  
de haricot et  
queue invisible

Miroir en coeur  
et faisceau de poils

Glandes odoriférantes

## REPRODUCTION

La reproduction du chevreuil est unique chez les cervidés. L'accouplement a lieu en plein été mais la gestation est différée en décembre, ce qui permet aux faons de naître à une époque plus favorable au mois de mai.



La chevrette donne naissance à 1 ou 2 faons, rarement 3, cachés dans les hautes herbes. Elle s'éloigne mais revient régulièrement les nourrir, ils ne sont pas abandonnés.

## LAISSÉES ET EMPREINTES



Sabot  
antérieur

Sabot  
postérieur

Crottes ou  
moquettes