ÉCUREUIL ROUX D'AMÉRIQUE - Tamiasciurus hudsonicus

Yeux entourés

de poils blanc



RÉGIME ALIMENTAIRE

Son alimentation est surtout constituée de graines, de pignes de pin, de noix et de fruits, bien qu'il lui arrive de consommer quelques petits invertébrés.

Comme la plupart de ses congénères, il constitue des réserves de nourriture qu'il cache à différents endroits afin de subvenir à ses besoins durant l'hiver.

REPRODUCTION

La période de reproduction de l'écureuil de Hudson se situe entre mars et avril. La femelle peut se reproduire à partir de l'âge de 1 an et peut avoir jusqu'à 2 portées par an. La gestation dure de 31 à 35 jours. Elle donne naissance à 4 petits en moyenne.

NON ÉVALUÉ DONNÉES INSUFFISANTES NE DD American Red Squirrel Ardilla Roja Americana

Classe : Mammifères Ordre : Rongeurs Famille : Sciuridés

Poids : 200 g

Statut : Espèce commune

© RED RI

FAIBLE RISQUE OU ABSENCE DE RISQUE D'EXTINCTION

PRÉOCCUPATION >
MINEURE
LC

QUASI MENACE VULNERABLE EN DANGER CRITIQUE D'EXTINCTION L'É

Amérique du Nord

Bande de poils noirs délimitant le dos et le ventre

The Hudson squirrel is a rodent that lives exclusively in coniferous and mixed forest of

northern America. It mainly nests in tree cavities. Seeds, nuts, fruits and pine cones are its main sources of food. It can store a large quantity of food in burrows in order to survive winter.

It breeds during march and april, gestation lasts from 31 to 35 days and females can give birth up to 4 youngs.

La ardilla de Hudson vive en los bosques de coníferas y mixtos de América del Norte. Prefiere construir su nido en las cavidades de los árboles, pero también puede construir un nido de hojas o cavar una madriguera.

Su dieta está principalmente constituida de semillas, piñas de pino, nueces y frutas, aunque en ocasiones consume pequeños invertebrados. Como la mayoría de sus congéneres, almacena reservas de alimento que esconde en diferentes lugares para cubrir sus necesidades durante el invierno.

La temporada de reproducción de la ardilla de Hudson tiene lugar entre marzo y abril. La gestación dura entre 31 y 35 días. Ella da a luz a 4 bebés en promedio.

À SAVOIR!

L'écureuil de Hudson se diférencie de son cousin européen par son contour de l'oeil clair et sa bande de poils noirs qui délimite le dos et le ventre.