

# VAUTOUR MOINE - *Aegypius monachus*



Black vulture  
Buitre negro

Classe : Oiseaux  
Ordre : Accipitriformes  
Famille : Accipitridés


Poids : 5 à 12 kg


Statut : Protégé

CLASSEMENT IUCN



Répartition géographique

 Disappeared in France at the beginning of the 20th century, it has been since 2004 part of a reintroduction program in the Great Causses and reproduces today again in our country. Unlike the tawny vulture specialized in the consumption of the viscera and muscles, the cinereous vulture is more specialized in the consumption of more tough parts like the skin, the tendons and the cartilages. Coupling takes place in the nest. The female lays between February and March only a single egg brooded alternately by the couple during 55 days. After his first flight at 4 months, the young is still dependent on his parents for his food. This vulture is not very sociable. Sedentary, it does not move much away from its breeding area and lives in couple or in small groups. The cinereous vulture is the only European vulture to nest in the trees, mainly pines.

 Desaparecido en Francia a inicios del siglo XX, desde 2004 forma parte de un programa de reintroducción en los Grands Causses y hoy en día se reproduce de nuevo en nuestro país. A diferencia del buitre leonado, especializado en el consumo de vísceras y músculos, el buitre negro es más especializado en el consumo de partes más duras, tales como piel, tendones y cartilagos. El apareamiento tiene lugar en el nido. La hembra pone entre febrero y marzo un sólo huevo, incubado alternativamente por la pareja durante 55 días. Después de su primer vuelo a los cuatro meses, los jóvenes siguen siendo dependientes de sus padres para la comida. Este buitre no es muy sociable. Sedentario, no se aleja mucho de su zona de reproducción y vive en parejas o en pequeños grupos. El buitre negro es el único buitre de Europa que anida en los árboles, principalmente pinos.



Superbe collerette de plumes érectiles

## RÉGIME ALIMENTAIRE

Contrairement au vautour fauve spécialisé dans la consommation des vicères et des muscles, le vautour moine est davantage spécialisé dans la consommation de parties plus coriaces comme la peau, les tendons et les cartilages.

## REPRODUCTION

Les accouplements ont lieu sur le nid. La femelle pond entre février et mars un seul œuf couvé alternativement par le mâle durant 55 jours. Après son envol à 4 mois, le jeune est encore dépendant de ses parents pour son alimentation.

## HISTOIRE

Disparu en France au début du 20<sup>ème</sup> siècle, il fait partie depuis 2004 d'un programme de réintroduction dans les Grands Causses et se reproduit à nouveau aujourd'hui dans notre pays.

## MŒURS

Ce vautour n'est pas très sociable. Sédentaire, il ne s'éloigne pas beaucoup de son aire de reproduction et vit en couple ou en petits groupes.



## À SAVOIR !

Le vautour moine est le seul vautour d'Europe à nicher dans les arbres, principalement les pins.